Kokkinostaphylo

Vass4R12s451-455





0Mtp602

XII 14 A9 Kokkinostaphylo

douted a tendential actual







DESIGNATION Kokkinostaphylo gea

CLOSIN PLANCHE 14 RANG A Souche9

Vigueur: 2

PORT: érig - 2 érig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 2 Date de Véraison: 8-8-14
Date de maturité: 29-8-74
Pourriture: 15 GRAPPE: G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P 15×15

disc. - Sph - cll. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$12
\$2 avec pepins - apyrène
\$4 f JUS: inc. - coloré

DESIGNATION: Kokkinostaphylo CLOS T PLANCHE 14 RANG A Souche 9 Vigueur: 2,5 PORT: érig - ½ érig - couché Millerandage: 5 Date de Véraison: 5-8 Date de Maturité: 3-9-75 x+3 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M-P: L - M- C BAIE : TG - G - M - P 16×16 disc. - (Sph) - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 7 s2 9 s3 7 avec pépins - apyrène JUS : Ind. - coloré

Kekkinostaphylo DESIGNATION : CLOS XI PHANCHE 14 RANG A Souche 9 Viguour : 3,5 PORT : érig - 4 érig - couché Millerandage 14 Date de Véraison: 2-8 Date de Maturité : 31876 Pourriture : 0 14 GRAPPE + G - W- P + L- H - C BAIE : TG - 6 0 - P 19117 disc. - Sph. - 611 - ov. obov. - cyl. - fas. COULSUR : Bl - Gr - Rs - Rs - H SAVEUR : 3 - m - ar - for - herb. avec pópins apyrène

Année: 1970
Emplacement XII 14 A9
Désignation / Kokkinostayhylo

Nombre	DATES		
Total	Dayeux		
1	5	3	
1	5	3	
1	5	3	
2			
3			
4			
5	1		
5	1		
6	23.3.70	4	

Année:
Emplacement TI - 1449 Désignation / Kohkuno staylylo

!!!!	Nombre ! Total !				A T E S			!
!!!!!!	d'yeux!	AD19	41.3	!!	!	. !	!	!
1 1 1	2 !	4	1	<u> </u>	!	!	!!!	!
! 2 %!	!!!		! !	!!!	!!	!	!!	!
! 3 !	2 !	4	! 0	1	!	1 72 6	!	!!
! 4 %!	!!		! !	!	Dec. 17	1.3.72x	!	!!
! 5 !	2 !	A	1	1	!	(-0)	! !	! !

Année: 1973

Emplacement XII 14 A9 Désignation Kokkinostaphylo

FINE THEN THEN THEN THEN THEN THEN THEN TH										
!	Nombre Total		DATES !							
1			14.3	! 24.3	28.3	30-3				
!	1	:3	0	0	! 0	! 0	!!!!!!!!			
!!	2	17	! -	!!	!!	!	1 1 1			
!	3	14	0	10	1	! 2 *	1 170 1			
!!	4	1	! -	!!	!!	!	Dlo 30-3-73x			
!	5	13-1	!1	! 2	2	! 2 ~				

daaraalaa taalaa taalaa taa

Désignation :

XII 14A9 s.1

Emplacement:

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duvoteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves on rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 6 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 68

nti alaataalaataidaataali

Désignation :

Emplacement:

XII 14A9 s.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan ()- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jauno 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement () sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Kokkinsstaphylo
XII 14A93.1

Désignation : Emplacement:

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

dontrodontodontodontod

: dos coloré C à raies 2 - vert 3. 51 - nocuds

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 52 - vrille

rouge foncé 4.

: coloré 7 - vert 6. 52 - bourgeon

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calus 71

Kokkionostaphylo
XII 14A93-1

Désignation : Emplacement :

landan landi

colonno

34 - potite 1 - moyenne 2 - grande 3.

FEUILLE ADULTE.

Face supérioure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6:

37 - Nervures : Face supérioure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 - entièrement rouge 4.

Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon 2- court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonnoux 6 - partiellement 6 - totalement 8.

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calu 74

Kokkinoslaphylo

Emplacement:

Désignation :

XI 14A94-3

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIL

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4)- noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 0 - ellipsoïde 0 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1)- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. well plpins (8)

31 - A pédicelle long 1 - moyenn? - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 0 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 74

```
EMPLACEMENT: XII 14A9 3-1 Kokkinostaphylo
                                          SARMENT DE VIGNE
                              : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2). moyen

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2).
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
                              unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                               : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 76

N° d'ordre: 0706-01 Désignation: hokkinostayhylo Origine:

Emplacement: \overline{M} 14-A9

8 - Angle des nervures 1 - 2 - 3.

9 - 1/L 1 - 2 - 3.

0 - 1/L 1 - 2 - 3.

1 - 1/L 1

liminaliminaliminaliminal

11 - Lobes 1 - 2 - 5 - 7 - 9. 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3. 13 - S. lat. inf. (prof.) # - 1 - 2 - 3. 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) 0 - 3 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents : forme 1 - 2 - 6. 17 - Dents: Méd/B 1 - 2 - 5 18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3). 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 6 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L₃ XX L:₃ ① - 2 - 3. 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : 1-(2)-3. Forme : (4) - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Pomergne 70